

**Merkblatt  
Hepatitis B - Postexpositionsprophylaxe**

Ihre Exposition hat möglicherweise zu einem Kontakt mit dem Hepatitis B-Virus geführt. Die verabreichten Immunglobuline in Kombination mit einer Aktivimpfung sollen verhindern, dass das Hepatitis B-Virus Sie infiziert.

Bis 6 Monate nach Exposition sind Kontrollen und Laboruntersuchungen erforderlich.

**Sie werden vom Hausarzt nachbetreut. Vereinbaren Sie einen Termin 1 Monat nach Exposition.**

- Haben Sie geschützten Sex, bis Sie ganz sicher sind, dass Sie Hepatitis B-negativ sind (während 3 Monaten nach Exposition). Regeln für geschützten Sex finden Sie auf der Homepage der AIDS-Hilfe Schweiz: <http://www.aids.ch>
- Spenden Sie kein Blut oder Gewebe/Organe während 6 Monaten nach der Exposition.  
Informieren Sie das Blutspendezentrum über die Exposition bei Blutspenden in den nächsten 12 Monaten.
- Falls Sie stillen, dürfen Sie dies weiterhin tun.
- Bei folgenden Symptomen sollten Sie sich beim Hausarzt melden:  
Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Grippegefühl, Übelkeit,  
Gelenkbeschwerden, Gelbsucht, Stuhlfärbung, Dunkelverfärbung des Urins.
- Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.